

FUNGITERM

Comprimidos auto incandescentes

DES-VET
PRODUTOS VETERINÁRIOS

DESCRIÇÃO: O **Thiabendazole** princípio ativo do **FUNGITERM**, pertence ao grupo dos benzimidazóis.

Os benzimidazóis alteram a permeabilidade da membrana celular de leveduras e fungos suscetíveis por meio do bloqueio da síntese do ergosterol (a dimetilação do lanosterol é inibida), o esterol celular primário dos fungos e provocando um bloqueio da divisão celular e conseqüente crescimento e reprodução.

- **FUNGITERM** não é corrosivo para os equipamentos.
- Não é tóxico para ovos embrionados.
- Tem amplo espectro de ação antifúngica.
- É altamente efetivo na diminuição de fungos patogênicos.
- Pode ser empregado em qualquer local que tenha problemas de contaminação fúngica e seja fechado.



COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido de 3 g contém:

Thiabendazole	0,70 g
Excipientes q.s.p.	3,00 g

Cada comprimido de 30 g contém:

Thiabendazole	7,00 g
Excipientes q.s.p.	30,00 g

INDICAÇÕES: **FUNGITERM** é um agente fumigante de ambientes fechados para uso em avicultura, e tem como principal característica ser um comprimido autoincandescente que propicia a sublimação de seu princípio ativo e se espalha pelo ambiente de maneira uniforme, penetrando em locais que não são alcançados pela desinfecção comum.

FUNGITERM é indicado na prevenção da aspergilose em ambientes fechados em avicultura, para as seguintes condições:

- nos incubatórios, em qualquer tempo durante a incubação dos ovos, devendo ser utilizado pelo menos uma vez por semana ou de preferência toda vez que houver entrada de ovos;
- na incubadora ou nascedouro, na época de transferência de ovos, antes da bicagem da casca (17-18 dias), com o objetivo de sanitizar o ambiente antes da eclosão;
- em qualquer ambiente fechado toda vez que o médico veterinário julgar necessário.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: **FUNGITERM** é indicado na proporção de 1 comprimido de 3 g para cada 2,5 m³ ou 1 comprimido de 30 g para cada 25 m³ de espaço a ser fumigado.

Para as duas apresentações forçar a chama do isqueiro, que acompanha as embalagens, sobre os comprimidos até que se inicie a queima.

Quando o comprimido abrir chama, apagar com um leve assopro e deixar que o produto autoincandeça. Fumigar por 15 minutos.

APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 500 comprimidos de 3 g cada, acompanhada de isqueiro e discos de papel aluminizado para a queima do produto.

Caixa contendo 2 embalagens plásticas com 45 comprimidos de 30 g cada, acompanhada de isqueiro para a queima do produto.