

ABAMECTINA

Premix

DESVET
PRODUTOS VETERINÁRIOS


DESCRIÇÃO: **ABAMECTINA PREMIX** é um endectocida auxiliar no controle de ácaros e piolhos de suínos a base de **Abamectina**, especialmente formulado para adição na ração de suínos.

É preparado com uma granulometria que permite a completa dispersão do princípio ativo na ração, proporcionando uma performance superior pela obtenção de uma mistura mais homogênea e equilibrada. Seu princípio ativo, a Abamectina, é uma avermectina do grupo das lactonas macrocíclicas e origina-se da fermentação do actinomiceto **Streptomyces avermetilis** que é uma bactéria do solo encontrada em matérias orgânicas em decomposição.

Não menos que 95% da Abamectina do produto **ABAMECTINA PREMIX** é do tipo B1a, o que garante uma qualidade de utilização diferenciada e com garantia de performance.

A Abamectina potencializa a ação inibidora neuronal do cordão nervoso ventral dos parasitos.

Nos nematódeos a interferência na transmissão dos impulsos nervosos ocorre entre células nervosas, enquanto nos artrópodes isto acontece entre células nervosas e musculares. Esta ação resulta na paralisia flácida e eliminação do parasito.



COMPOSIÇÃO:

Cada 100 g do produto contém:

Abamectina	0,60 g
Excipientes q.s.p.	100,00 g

INDICAÇÕES: Vermes redondos gastrointestinais: **Ascaris suum** (adultos e larvas de 4º estágio); **Hyostrogylus rubidus** (adultos e larvas de 4º estágio); **Strongyloides ransonii** (adultos e no controle de larvas transmitidas via colostro).

Vermes pulmonares: **Metastrongylus spp.** (adultos).

Vermes renais: **Stephanurus dentatus** (adultos e larvas de 4º estágio).

Ácaros: **Sarcoptes scabiei var. suis**.

Piolhos: **Haematopinus suis**.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: Produto de uso oral para ser administrado via ração.

A dosagem para suínos em crescimento é obtida através da inclusão de Abamectina à ração completa na proporção de 2g/tonelada e administrada ad libitum a suínos com até 40 kg de peso corporal.

O produto deve ser completamente misturado à ração pronta. A dispersão da Abamectina é facilitada através da pré mistura de 1 kg (3 saquinhos) do produto em 14 kg de ração. A mistura deve ser adicionada na proporção de 5 kg/tonelada de ração, obtendo então 2g de Abamectina por tonelada de ração.

Para suínos adultos a dose recomendada por 7 dias consecutivos é obtida através da mistura de 1,66 kg do produto (5 saquinhos) em 1 tonelada de ração. Essa ração medicada deve ser administrada na proporção de 1kg para cada 100 kg de peso corporal diariamente por 7 dias consecutivos. Os animais não devem receber nenhuma ração adicional até que a ração medicada seja completamente consumida.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 5 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 5 quilos de produto (fracionados em sachês metalizados de 333 gramas).