



DESCRIÇÃO: DV-FLOR é um antimicrobiano bacteriostático de amplo espectro formulado a base de Florfenicol. O Florfenicol atua através da interferência na síntese de proteína bacteriana, unindo-se a sub unidade 50 S do ribossoma da bactéria, inibindo a enzima peptidil transferase e provocando a morte da bactéria. Apresenta rápida absorção, excelente distribuição tecidual e amplo espectro de ação contra organismos gram-negativos e gram-positivos.

Após a administração oral, cerca de 80% do Florfenicol é absorvido atingindo, em aproximadamente uma a duas horas, níveis séricos necessários para inibir o crescimento das bactérias sensíveis a ele. Devido ao seu baixo coeficiente de fixação a proteínas plasmáticas, o Florfenicol se mantém de forma livre e ativa no soro por longo tempo, propiciando maior eficácia na destruição das bactérias nos tecidos.

Produto formulado em alta concentração, observando a indicação de dosagem internacionalmente utilizada.



COMPOSIÇÃO:

Cada 100 g do produto contém:

Florfenicol	40,00	g
Excipientes q.s.p.	100,00	g

INDICAÇÕES:

DV-FLOR está indicado para o tratamento das doenças respiratórias, entéricas, genitourinárias, incluindo cistites e metrites e outras infecções dos suínos causadas por agentes sensíveis ao Florfenicol, tais como: **Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Streptococcus suis.**

Referências bibliográficas indicam eficiência, que pode ser comprovada através da realização de antibiogramas, contra outras bactérias Gram + e Gram -, tais como **Haemophilus, Listeria, Clostridium e Lawsonia intracellularis**, as quais podem ser contempladas no tratamento por prescrição do Médico Veterinário.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: Produto em pó para administração via oral na ração de suínos.

Oferecer de modo que o medicamento fique disponível durante todo o tempo de tratamento.

O produto foi testado em ração medicada por um período de 30 dias durante o qual manteve inalteradas suas propriedades.

A posologia é de 10 mg de Florfenicol por kg de peso corporal por dia durante 3 a 5 dias consecutivos.

Calcular o peso aproximado do lote a ser tratado, a quantidade de produto a ser utilizada e o consumo médio diário de ração de modo que o medicamento fique disponível durante todo o tempo de tratamento.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 7 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO: Embalagem com 25 kg do produto.