

DESCRIÇÃO: FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL é um produto anti-infeccioso à base de uma quinolona carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos tratos digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso.

FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL caracteriza-se por ser um produto de altíssima solubilidade e, principalmente por ter um veículo inorgânico, em hipótese alguma provoca o entupimento de bebedouros e outros utensílios utilizados na avicultura. FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL pode ser administrado tanto via água como via ração, pois o enrofloxacino-base e seus veículos não provocam alterações na palatabilidade.



COMPOSIÇÃO:

Cada 100 g do produto contém:

Enrofloxacino	50,00 g
Excipientes q.s.p.	100,00 g

INDICAÇÕES: FLUOQUIN PÓ SOLÚVEL está indicado para o tratamento e controle de doenças respiratórias e entéricas das aves causadas por:

Escherichia coli, Haemophilus spp, Salmonella spp, Staphylococcus spp, Clostridium spp, Shigella spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Campilobacter spp e Mycoplasma spp.

A critério do médico veterinário, outras infecções causadas por germes sensíveis ao enrofloxacino.

MODO DE USAR E POSOLOGIA: Administração via oral, por meio da água de bebida após pré-diluição, ou via ração. Diluir 50 g do produto em 500 litros de água para medicar 2.500 kg de peso vivo. Na ração, 50 g do produto para medicar 2.500 kg de peso vivo. Ajustar a quantidade do produto na ração de acordo com a fase de crescimento.

O produto deverá ser fornecido aos animais por 3 a 5 dias, não devendo o tratamento ser interrompido até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

No caso de salmoneloses, o tratamento deverá ser de no mínimo 5 dias.

A posologia básica é de 10 mg de enrofloxacina por quilo de peso vivo por dia.

PERÍODO DE CARÊNCIA: 8 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO: Caixa contendo 5 kg (fracionados em sachês metalizados de 100 g) e 20 kg do produto.