



NORFLOXAZOL 30

Solução

DESCRIÇÃO:

NORFLOXAZOL 30 é um produto antimicrobiano à base norfloxacina, uma quinolona carboxílica de terceira geração de ação rápida e eficaz para o tratamento de infecções dos tratos digestivo e respiratório, sistema locomotor e nervoso em aves e suínos.

O produto **NORFLOXAZOL 30** tem as seguintes vantagens:

- é de altíssima biodisponibilidade, por ser um produto em solução pronta para uso, o que proporciona uma rápida absorção e a obtenção dos níveis séricos desejáveis em curto espaço de tempo;
- seu veículo contém o ácido acético glacial em concentração terapêutica, o que proporciona uma discreta estimulação das secreções brônquicas, facilitando a ação do princípio ativo mesmo nas infecções mais severas do sistema respiratório de aves e suínos.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém:

Norfloxacino.....	30,00 g
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

INDICAÇÕES:

NORFLOXAZOL 30 é indicado para o tratamento das doenças respiratórias e entéricas das aves e suínos, causadas por germes sensíveis ao norfloxacino tais como:

Aves - *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma gallisepticum*, *E. coli*, *Salmonella spp*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus spp.* e *Streptococcus spp.*

Suínos - *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida* e *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus pleuropneumoniae* e *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Infecções mistas: *Mycoplasma spp* + *Pasteurella multocida* (síndrome MMA), *Mycoplasma spp* + vírus (pneumonias viróticas).

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Produto em solução, pronto para uso, que deve ser diluído na água de bebida de acordo com a posologia abaixo:

Aves: a posologia básica é de 15 mg de norfloxacino por quilo de peso vivo por dia ou diluir 5 mL do produto em 20 litros de água para medicar 100 kg de peso vivo de 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.

Suínos: a posologia básica é de 7 mg de norfloxacino por quilo de peso vivo ao dia ou diluir 25 mL do produto em 50 litros de água para medicar 1.070 kg de peso vivo e fornecer aos animais por 3 a 5 dias ou a critério do médico veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Aves - 7 dias antes do abate.

Suínos - 10 dias antes do abate.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem contendo 24 frascos de 500 mL.

